



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

La Riduzione del danno nel quadro delle politiche europee

Dagmar Hedrich

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Torino, Centro Congressi “Molinette Incontra”, 14 giugno 2018

LEA: la Riduzione del Danno è un diritto



EMCDDA/OEDT

Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze

Un'agenzia decentralizzata della UE di raccolta di informazioni sulle droghe, con sede a Lisbona, nata nel 1993

Con una rete di Punti Focali Nazionali in 30 Paesi

Principali prodotti:

- European Drug Report,
- Statistical Bulletin,
- European Guide on Health and Social Responses
- Guidance
- Country Drug Reports
- Best Practice Collection
- Other thematic web-based and print products



Struttura della presentazione

1. Andamento delle politiche in tema di droghe e Riduzione del danno nella UE: un rapido viaggio indietro nel tempo
2. Che cosa è stato raggiunto? I principali interventi di RdD oggi
3. Nuove sfide nell'adattamento e diversificazione degli interventi di RdD





emcdda

Andamento delle politiche in tema di droghe e Riduzione del danno nella UE: un rapido viaggio indietro nel tempo

Documenti di politica europea sulla droga

1990: Piano Europeo di contrasto sulle droga

1992: Piano Europeo di contrasto alla droga

Piano di Azione Europeo per il contrasto alla droga

1995-1999



Strategia dell'Unione europea in materia di droga
2000-04

2005-12

2013-20



Fine degli anni '80 e primi anni '90 ...

Anni '80: epidemia di morti per overdose e la crisi HIV/AIDS in Europa

Le sostanze sono consumate pubblicamente in diverse città europee

Dalla metà degli anni '80 politici e parlamentari europei chiedono un approccio comune

Le conferenze organizzate nelle **città** sostengono la tesi di un approccio basato sulla Riduzione del danno, che affronti entrambi i problemi di salute pubblica e sicurezza delle comunità

1990: prima Harm Reduction Conference a Liverpool



Fine degli anni '80 e primi anni '90 ...


1985: commercializzazione del primo test per HIV
→ consapevolezza dell'epidemia tra i consumatori di sostanze per via iniettiva

1990: Piano Europeo per il contrasto alla droga

1992: Piano Europeo per il contrasto alla droga

1990

1992



*Data as of 1 October 2005, based on partial and preliminary national reports.

Source: Sexually transmitted infections HIV/AIDS programme, unpublished data, 2005.





Nel corso degli anni '90...

1990: Piano Europeo per il contrasto alla droga

1992: Piano Europeo per il contrasto alla droga

Piano di Azione Europeo per il contrasto alla droga
1995-1999



Introduzione ufficiale dei programmi di distribuzione/scambio siringhe (NSP) e di trattamenti sostitutivi con metadone (OST) nella maggior parte dei Paesi UE; sale di consumo (DCRs) in alcune città

1993: Trattato sull'Unione Europea → Osservatorio europeo


1996: una potente combinazione di terapie antiretrovirali (ART) rende l'infezione da HIV una malattia cronica gestibile



Quiz

Quale tra questi Paesi è stato il primo a introdurre il trattamento sostitutivo con metadone?


- Olanda
- Italia
- Svezia
- Francia



Quiz

Quale tra questi Paesi è stato il primo a introdurre il trattamento sostitutivo con metadone?

- Olanda
- Italia
- **Svezia - 1967**
- Francia




All inizio degli anni 2000

Normalizzazione' e aumento degli interventi RdD – OST/NSP,
... DCR in altre città

2003: Raccomandazione del Consiglio-

I primi a riconoscere la Riduzione del danno come politica essenziale
a livello europeo



Strategia dell'Unione europea
in materia di droga 2000-04



Raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e riduzione dei danni per la salute associati alla dipendenza da sostanze




La prima decade di questo millennio...

Consolidamento e diversificazione degli interventi di RdD

Aumento della disponibilità di OST

Come è cambiato il linguaggio... "RdD"



Strategia dell'Unione europea in materia di droga 2005-12

‘Obiettivo ultimo ridurre significativamente... il danno alla salute e sociale causato dall’uso e il commercio di droghe illecite (health damage)



Vengono riconosciuti gli interventi efficaci

Guida congiunta ECDC/EMCDDA (2011):
Prevenzione e controllo delle malattie infettive
tra PWID

Sono raccomandati 7 interventi

- Distribuzione di materiale per il consumo di sostanze
- Vaccinazioni
- Trattamento delle dipendenze
- Test
- Trattamento delle malattie infettive
- Promozione della salute
- Offerta mirata dei servizi




Posizione comune dell'Unione Europea all'UNGASS 2016

Strategia dell'Unione europea in materia di droga 2013-2020

Posizione comune dell'Unione Europea all'UNGASS 2016:


L'UE e i suoi Stati membri ritengono che politiche di riduzione della domanda di droga efficaci, mirate, multidisciplinari e basate su prove devono includere prevenzione, diagnosi precoce e intervento, riduzione dei rischi e dei danni, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero e basate sulla continuità del servizio consegna.



Diminuire il numero di infezioni da HIV tra i tossicodipendenti
Calo del 51 %
tra il 2007 e il 2016

Newly diagnosed HIV cases related to injecting drug use

Cases in the European Union






emcdda

Che cosa è stato raggiunto? I principali interventi di RdD oggi


OST - NSP

- Le evidenze dimostrano che i NSP sono efficaci nel ridurre la trasmissione di HIV
- 628.000 ricevono trattamento sostitutivo con oppioidi

Trends in the number in substitution treatment



Geographical availability of needle and syringe programmes in the European Union, Norway and Turkey




Prevalenza di epatite C: differenze nazionali

- 2015-16 il range di prevalenza va da 12 % a 87 %
- 6/13 Paesi riportano dati nazionali con tassi superiori al 50 %
- I trattamenti senza interferone a somministrazione orale con agenti DAA (direct-acting antiviral) possono portare alla guarigione nel 95 % dei casi




Prevalence of hepatitis C virus infection among people who inject drugs, by age, 2015 to 2016



NB: Samples smaller than 10 are not shown. The order of countries follows the under-25 data.

La riduzione delle morti per overdose rimane un obiettivo di salute pubblica difficile da raggiungere

- Oltre 9.000 morti per overdose nel 2016
- Morti soprattutto dovute a eroina e altri oppioidi
- Gli oppioidi sintetici sono una preoccupazione (farmaci e NPS es. derivati del fentanyl)
- Incrementare l'accesso all'antidoto naloxone è importante



Reducing fatal outcome of overdose

Supervised drug consumption
Immediate first-aid in drug emergencies

Take-home naloxone programmes
Improved bystander response

Reducing risk of overdose

Retention in opioid substitution treatment
Reduce drug use and injecting

Overdose risk assessments
In treatment facilities and prisons

Overdose awareness
Knowledge of risk and safer use

Reducing vulnerability

Outreach and low-threshold services
Accessible services

Enabling environment
Removing barriers to service provision


Empowerment of drug users
Enabling drug users to protect themselves

Public health approach
Recognition of wider impact



1.3 milioni di persone in trattamento

Proportion of clients receiving different types of prescribed opioid substitution medication in European countries




- Il metadone è il più comune OST




Andamenti e coperture nazionali variano

Disponibilità di interventi specifici per ridurre le morti causate da oppioidi in 30 Paesi europei



Source: EMCDDA (2017) Health and social responses to drug problems: a European guide.

Copertura geografica delle stanze per il consumo (DCRs) in Europa



Source: Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence. EMCDDA 2017.

Sviluppi

Screening con test rapidi al fuori dai contesti sanitari (30 min)

2014: farmaci DAA per la cura di HCV

2015: Linee guida per HIV di WHO: “Test and treat”
Trattamento per HIV come prevenzione (TasP)


2015/16 Piano per l’eliminazione delle epatiti virali



Tecniche e applicazioni del drug checking

FIGURE 3.8

Examples of drug checking techniques and application






emcdda

Nuove sfide nell'adattamento e diversificazione degli interventi di RdD


Consumatori di oppioidi ad alto rischio: l'eroina domina ancora

- 1.3 milioni di consumatori di oppioidi
- Prevalentemente consumatori di eroina, ma anche di altri oppioidi sintetici
- Il numero di pazienti che hanno avviato un trattamento per la prima volta nella vita per problemi legati all'uso di eroina rimane sotto 30.000 dal 2011

Trends in first-time entrants



Route of administration



23 Mean age at first use


34 Mean age at first treatment entry



Morti per overdose: in aumento per il quarto anno consecutivo

- 9.138 morti nel 2016
- Eroina e altri oppioidi rimangono le principali sostanze coinvolte nei decessi
- L'aumento nei decessi si riscontra in tutte le fasce di età


Trends in overdose deaths



■ Turkey ■ Spain ■ Sweden ■ Germany
■ United Kingdom ■ Other countries

Number of drug-induced deaths reported in the European Union in 2012 and 2016, or most recent year, by age band


Number of deaths




Sequestri di NPS: i catinoni sintetici e i cannabinoidi continuano a dominare

Number of seizures of new psychoactive substances reported to the EU Early Warning System: trends and distribution by category in 2016

Number of seizure cases




NB: Data for EU Member States, Turkey and Norway.



Sequestri di NPS: i catinoni sintetici e i cannabinoidi continuano a dominare

Number of seizures of new psychoactive substances reported to the EU Early Warning System: trends and distribution by category in 2016

Number of seizure cases




NB: Data for EU Member States, Turkey and Norway.



NPS: nel 2017 nove valutazioni di rischio per sostanze estremamente potenti

4 cannabinoidi sintetici

- NPS più frequentemente sequestrate
- Spesso sotto forma di mix di erbe per il fumo



Copyright: Jan Schäper.




Copyright: Jan Schäper.

5 derivati del fentanyl

- Estremamente potenti
- Sempre più abusati
- Sotto varie forme (polveri, pasticche, spray nasali)



Copyright: Anders Helander.



Copyright: Norwegian National Criminal Investigation Service (Kripos).



Copyright: Swedish Police.

Il futuro?



Il futuro?

Test per le malattie infettive come standard in tutti i servizi per il trattamento delle dipendenze e nei servizi della community (min standard europeo)

Distribuzione di tutti gli strumenti utili all'iniziazione e al consumo

Test rapidi per HCV-RNA disponibili e a prezzi accessibili

Trattamenti per HCV a costi contenuti

Raccomandazioni per l'approccio "test and treat" HCV

Attenzione e consapevolezza della possibilità di overdose nel momento dell'uscita dal carcere

Distribuzione di naloxone ampiamente disponibile

Accesso al drug checking





European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

Consultateci: emcdda.europa.eu

dagmar.hedrich@emcdda.europa.eu

emcdda.europa.eu

 twitter.com/emcdda

 facebook.com/emcdda

 youtube.com/emcddatube

 flickr.com/photos/emcdda