



La RDD nel PNAIDS

Torino, 14 giugno 2018



Massimo Oldrini – LILA

m.oldrini@lila.it

Componente del Comitato Tecnico Sanitario del MdS – Sezione L
Commissione AIDS

Perché? Piano nazionale AIDS

- Globalmente nel nostro paese l'infezione da HIV non accenna a diminuire




Figura 1 - Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV e incidenza per anno di diagnosi (2010-2016)

Fonte: Notiziario 30 COA ISS 2017


http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2661_allegato.pdf

Piano nazionale AIDS

Perché?

- Altissima percentuale di late presenter 55,6%, problema sia di salute individuale sia di salute pubblica

Nuove diagnosi di infezione da HIV con linfociti CD4 <200/mmc Italia 2010-2016



Fonte: Notiziario 30 COA ISS 2017

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2661_allegato.pdf

Piano nazionale AIDS

Perché?

- Nel 2017 in Europa l'Italia si colloca al **13° posto** per numero di **nuove infezioni** da HIV, mentre **resta stabilmente al 2° posto per numero di casi AIDS**
- E i **consumatori** per via endovenosa risultano **tra i più esposti all'infezione** – Key Populations

Fonte: Notiziario 30 COA ISS 2017

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2661_allegato.pdf

Per questo **nel PNAIDS** viene data **alta rilevanza** alle **strategie di RDD** quali strumenti **fondamentali** per una **prevenzione efficace e integrata**

La RDD nel Piano nazionale AIDS

Perché

- Strategia ancora osteggiata nonostante evidenze scientifiche e indicazioni internazionali
- Necessaria per il controllo dell'infezione in una key population (consumatori)
- Evidenze e dati ufficiali fotografano un quadro preoccupante della diffusione di HIV ed epatiti tra la popolazione che consuma sostanze nel nostro paese

Altissime prevalenze HIV e HCV tra la popolazione che consuma sostanze



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction



Results hosted on duckduckgo.com

Countries

[Austria](#)

[Belgium](#)

Italy

Country Drug Report 2018



Prevalence of HIV and HCV antibodies among people who inject drugs in Italy (%)

region	HCV	HIV
National	56.6	28.7
Sub-national	:	:

Year of data: 2016

Percentages are referred to the number of tested injecting drug clients

The prevalence rate of HIV infection among PWID is considered average in the European context. Almost a third of the new treatment clients in 2016 were HIV positive, but the number of clients tested was small.


Fonte: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/italy/drug-harms_en

Terapie sostitutive poco utilizzate

Relazione europea sulla droga 2018: Tendenze e sviluppi

FIGURA 3.4

Copertura del trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppiacei (percentuale della stima dei consumatori di oppiacei ad alto rischio che ricevono l'intervento) nel 2016 o nell'anno più recente e nel 2007-2008



NB: i dati sono indicati come stime puntuali e intervalli di incertezza.

Programmi di distribuzione inesistenti Non trascurabile numero overdose



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

Search



Results hosted on duckduckgo.com

Countries

Austria

Belgium

Italy

Country Drug Report 2018




Syringes distributed

through specialised programmes

No Data

Overdose deaths




Fonte: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/italy_en

Fortemente coinvolti anche i giovani consumatori

Relazione europea sulla droga 2018: Tendenze e sviluppi

FIGURA 3.10

Prevalenza dell'infezione da epatite C tra consumatori di droghe iniettabili, per età, 2015-2016



Fonte: NB: i campioni inferiori a 10 non vengono mostrati. L'ordine dei paesi segue i dati relativi ai soggetti con età inferiore a 25 anni.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ITN_PDF.pdf

Italia al secondo posto per diagnosi di AIDS in consumatori




European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

Search



Results hosted on duckduckgo.com



Fonte: <http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2018/drid>


Elevato numero di diagnosi di HIV... nonostante...



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction




Results hosted on duckduckgo.com



Fonte: <http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2018/drid>

...lo scarsissimo ricorso al test HIV





Con conseguenze gravissime per i consumatori e per il SSN, sia oggi...

HIV infections diagnosed, 2011

CD4 cell count and transmission mode (n=15 625)



Percent distribution of CD4 counts among new HIV diagnoses by transmission mode, Italy 2010-2011




In Italia, la percentuale di PWID con meno di 200 CD4 al momento della diagnosi è maggiore di circa il 15% della media europea

Fonte: L. Camoni et al, COA ISS – Camoni et al. BMC Public Health 2013

...che in futuro

**STIMA DELLA PROPORZIONE DI INCONSAPEVOLI DEL RISCHIO DI HIV IN ITALIA:
ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA HIV**

*Maria Dorrucci, Vincenza Regine, Patrizio Pezzotti, Barbara Suligoj (Istituto Superiore di Sanità, Roma)
Alessia Mammone, Enrico Girardi (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "L. Spallanzani", Roma)*



Nel sistema italiano di sorveglianza HIV abbiamo stimato un'elevata percentuale di persone che alla prima diagnosi risulta essere inconsapevole di essersi esposta all'HIV (almeno il 40%). La trasmissione per uso iniettivo di sostanze, la trasmissione eterosessuale, l'essere residenti nel Nord Italia, il genere femminile, nonché l'età più avanzata sono risultati fattori di rischio associati alla inconsapevolezza del rischio di HIV.

Fonte: Notiziario 30 COA ISS 2017

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2661_allegato.pdf

Per questo è necessario dare nuovo impulso alle strategie di RDD

Come

- Riportando l'**attenzione alle questioni sanitarie** nelle **policy e nei servizi** per i consumatori di sostanze
- Aumentando l'**interazione** tra il mondo **dipendenze** e quello **infettivologico**
- **Sfruttando i lavori del tavolo congiunto MdS e CSR** per l'attuazione del PNAIDS
- **Basando le decisioni sulle evidenze scientifiche** e non su posizioni ideologiche
- **Finanziandole** adeguatamente

Per questo è necessario dare nuovo impulso alle strategie di RDD

Cosa è più urgente

- Riattivare programmi nazionali di scambio di siringhe
- Favorire l'accesso al test per HIV ed epatiti
- Promuovere l'empowerment e riconoscere i diritti delle persone che consumano sostanze
- Prestare attenzione ai nuovi fenomeni (chemsex, NPS...)
- Introdurre gli interventi ancora osteggiati (drug checking, stanze del consumo, carcere...)

Sconfiggere l'HIV è possibile!



Grazie!

m.olderini@lila.it