

REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale


BOLLETTINO VITE n° 21 del 1/08/2019 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 2 agosto		Instabilità con probabili rovesci o temporali nei rilievi, in locale estensione alla costa. T stazionarie.
SABATO 3 agosto		Ritorno a condizioni stabili e soleggiate. Nelle ore centrali nubi cumuliformi sui rilievi. T max in aumento.
DOMENICA 4 agosto		Soleggiato. Temperature stazionarie.
LUNEDÌ 5 agosto		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 6 agosto		Nubi irregolari. Temperature in calo.
MERCOLEDÌ 7 agosto		Aumento delle nubi. Temperature stazionarie.

Dati meteo disponibili su <http://omirl.regione.liguria.it/Omirl/#/map>

FENOLOGIA - rilievi del 29 luglio



Informazioni sulla scala fenologica BBCH vite

http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Zone costiere: inizio invaiatura

Zone interne: chiusura del grappolo, acini ancora duri e compatti, ad eccezione del *Pigato* nel ponente provinciale (Ortovero), dove si inizia a percepire una maggiore elasticità degli acini, segno di un imminente inizio della maturazione.

Foto Agt. D. Passaniti: grappolo di *Pigato* del ponente provinciale



SITUAZIONE IDRICA

Le piogge cadute durante la settimana hanno complessivamente soddisfatto le esigenze idriche delle piante in tutto il territorio. In alcune aree le precipitazioni sono state anche intense e copiose, soprattutto nel levante provinciale e considerato che le piante, almeno in costa, stanno entrando nella fase di invaiatura, per questa settimana non si consigliano interventi neanche negli impianti giovani.

Per consultare la situazione su tutto il territorio provinciale


<https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>

Si ricorda che una volta raggiunta la fase di invaiatura, considerando anche il decorso meteo attuale con ulteriori possibili piogge, gli interventi irrigui saranno interrotti.

SITUAZIONE METEO

Le temperature sono calate, anche in corrispondenza degli eventi piovosi, attestandosi su valori massimi inferiori ai 30 °C negli ultimi giorni. Anche le minime sono diminuite, per poi risalire negli ultimi giorni intorno a valori di 20-21 °C.

Gli eventi piovosi hanno interessato tutto il territorio nelle giornate del 27 e 28 luglio, apportando cumulati di 30-40 mm in media, con valori superiori nel levante provinciale.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Lungo la fascia costiera e nelle zone interne la difesa è da ritenersi conclusa.

Dopo le piogge di sabato 27 rinnovare la copertura con **rame** nelle zone di fondovalle e quelle poste a maggiore altitudine in una fase di sviluppo un po' più arretrata.

OIDIO - Nei vigneti posti in zone interne mantenere la copertura con zolfo bagnabile a basso dosaggio o in alternativa utilizzare prodotti specifici e allungare i tempi tra i trattamenti. Verificare il periodo di carenza dei prodotti utilizzati e attenzione all'uso tardivo dello zolfo, che può contribuire a sviluppare nel vino odori sgradevoli. Per limitare le quantità di zolfo cercando di evitare interventi tardivi, si potranno utilizzare, alternandoli, **bicarbonato di potassio** (es. *Armcarb*, *Karma*) o **laminarina** (*Vacciplant*).

TIGNOLETTA - le catture rilevate sono ancora basse, pertanto al momento non si consigliano interventi.

MUFFA GRIGIA/BOTRITE - Al momento non si consigliano interventi con prodotti specifici. Solo nel caso in cui si notino lesioni agli acini si potrebbe intervenire con rame addizionato a prodotti corroboranti come polvere di roccia (es. *zeolite*) oppure zolfo bentonitico (es. *Sulfurene*), con la finalità di favorire l'essiccamento naturale degli acini colpiti. Eventuali trattamenti specifici andranno valutati sulla base del decorso meteo, della sensibilità del vigneto/vitigno e in fase di invaiatura, tenendo conto che i principi attivi utilizzabili andranno valutati sulla base del tempo di carenza che del numero **massimo di interventi ammessi**. Lista dei prodotti commerciali <http://bit.ly/combrotite19>

Scheda tecnica BOTRITE disponibile al link <http://bit.ly/botrite19>

AZIENDE BIOLOGICHE - Peronospora: in previsione di pioggia o subito dopo, ripristinare la copertura con rame, utilizzando prodotti a maggior efficienza e tenendo presente sempre il limite massimo di rame ad ettaro all'anno (*da quest'anno non superare in media i 4 kg/ha/anno*). **Oidio:** mantenere la copertura con **zolfo**, con un intervallo di circa 4-6 giorni in situazioni ad alto rischio. E' possibile diminuire le dosi di zolfo associandolo con l'olio essenziale di arancio dolce (*Prev-Am plus*). In alternativa allo zolfo, o alternando i trattamenti, si potrà utilizzare **bicarbonato di potassio** (es. *Armcarb*, *Karma*), con effetto complementare antibotritico o **laminarina** (*Vacciplant*).

GESTIONE VIGNETO

Le piogge dell'ultimo periodo potrebbero favorire nuovamente un rapido sviluppo della vegetazione, considerando anche le temperature non troppo elevate. Pertanto, nel caso in cui vi sia necessità di contenere la vegetazione effettuare le ultime cimature in zona costiera e primo entroterra per favorire l'arieggiamento della zona grappolo.



I servizi informativi regionali accessibili tramite Telegram si arricchiscono di nuove funzionalità. Attraverso **CAARserviziBot**, oltre agli ultimi bollettini, alle schede tecniche e ai disciplinari regionali di produzione integrata, sarà possibile ricevere, a livello comunale, **informazioni sulla situazione idrica o le previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**.

Scaricare l'applicazione Telegram e cercare **CAARserviziBot**. Guida <http://bit.ly/guidacaarbot>